

ИНСТРУКЦИЯ

по применению Кофасил® Ликвид
для силосования кормовых культур для сельскохозяйственных животных.

(организация-производитель компания «ADDCON Europe GmbH» / «АДДКОН
Юроп ГмбХ », Германия)

I. Общие сведения

1. Кофасил® Ликвид (Kofasil® Liquid) – добавка кормовая для силосования кормовых культур для сельскохозяйственных животных.

2. В состав добавки кормовой входят: нитрит натрия - 245 г/л, гексаметилентетрамин – 164 г/л, вода – до 1 л.

Добавка кормовая не содержит генно-инженерно-модифицированных продуктов.

3. По внешнему виду представляет собой жидкость желтоватого цвета без запаха.

4. Выпускают расфасованным по 265 кг в бочки из высокоплотного полиэтилена, по 1230 кг в контейнеры из высокоплотного полиэтилена и наливом.

Каждую упаковку маркируют на русском языке с указанием: организации-производителя, его адреса и товарного знака, наименования, назначения и способа применения добавки, состава и гарантированных показателей, массы добавки в единице фасовки, даты изготовления, срока годности, условий хранения, номера партии, надписи «Для животных», информации о подтверждении соответствия и снабжают инструкцией по применению.

5. Хранят в сухом, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей хорошо вентилируемом месте при температуре от 5°C до 20°C. Избегать замораживания.

Срок хранения –24 месяца со дня изготовления.

Не использовать по окончании срока хранения.

II. Биологические свойства

6. Свойства Кофасил® Ликвид обусловлены входящими в его состав компонентами, которые обеспечивают превосходную защиту от гнилостного брожения при помощи избирательного угнетения неблагоприятных организмов и компонентов, таких как производители масляной кислоты клостридии, энтеробактерии, листерии. При этом добавка не затрагивает молочнокислое брожение, поэтому естественное силосование проходит беспрепятственно.

III. Порядок применения

7. Кофасил[®] Ликвид применяют для силосования тяжело- и среднесилосуемых кормовых культур для сельскохозяйственных животных, таких как бобовые, цельные зерновые.

8. Кофасил[®] Ликвид вносят в корма в дозе 2-3 л на тонну корма.

Норма внесения зависит от вида культуры и ее влажности.

9. Побочных явлений и осложнений при применении Кофасил[®] Ликвид в соответствии с инструкцией не установлено. Противопоказаний к применению Кофасил[®] Ликвид не имеется.

10. Кофасил[®] Ликвид совместим со всеми ингредиентами кормов, другими кормовыми добавками и лекарственными средствами.

11. Продукцию животноводства после применения Кофасил[®] Ликвид можно использовать в пищевых целях без ограничений.

IV. Меры личной профилактики

12. При работе с добавкой кормовой Кофасил[®] Ликвид следует соблюдать правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренными при работе с кормовыми добавками, применять средства индивидуальной защиты: спецодежду, защитные перчатки и очки или защитный щит для лица.

13. При попадании в глаза и на кожу немедленно промыть большим количеством воды, при проглатывании обратиться к врачу.

14. Кофасил[®] Ликвид следует хранить в местах, недоступных для детей.

Инструкция по применению разработана организацией-производителем компанией «ADDCON Europe GmbH», Германия.

Адрес производства: Säurestraße 1, Areal E, D – 06749, Bitterfeld-Wolfen, Germany.

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНИИ»

Регистрационный номер ПВИ-2-35.12/03880