

ИНСТРУКЦИЯ

по применению добавки кормовой «ЛАКРУА® ЦинкоСтар»

1. Торговое наименование кормовой добавки. Назначение.

«ЛАКРУА® ЦинкоСтар».

«ЛАКРУА® ЦинкоСтар» – кормовая добавка, предназначенная для ввода в состав комбикормов, премиксов и БВМД для всех групп свиней (поросята-сосуны, поросята-отъемыши, свиньи из группы дорастивания и откорма) с целью обогащения рационов цинком, повышения показателей продуктивности, стимуляции иммунитета, улучшения обмена веществ и состояния здоровья.

2. Состав. Содержание и химическое назначение действующих и вспомогательных веществ кормовой добавки.

Кормовая добавка «ЛАКРУА® ЦинкоСтар» состоит из оксида цинка не менее 93 % с показателем влажности не более 7 % и содержание чистого цинка (Zn^{2+}) не менее 75 %.

3. Форма выпуска кормовой добавки. Внешний вид.

Кормовая добавка «ЛАКРУА® ЦинкоСтар» представляет собой порошок от белого до бледно-желтого цвета, не летучий и не растворимый в воде.

4. Фасовка, упаковка, условия хранения, транспортировки, срок годности кормовой добавки.

Выпускают кормовую добавку в мешках весом по 20 кг в многослойных бумажных мешках с полиэтиленовым вкладышем высокой плотности.

«ЛАКРУА® ЦинкоСтар» хранят в оригинальной упаковке в сухом и прохладном помещении, с хорошей вентиляцией, избегая попадания прямых солнечных лучей. Температура хранения от минус 25 °С до плюс 30 °С и относительной влажности 75 % ± 5 %.

Срок годности 24 месяца с даты производства. Не использовать по истечении срока годности.

5. Основные биологические и другие свойства кормовой добавки.

Кормовая добавка «ЛАКРУА® ЦинкоСтар»:

обеспечивает физиологическое протекание ферментативных процессов (является кофактором ферментов карбоксипептидаз, карбоангидраз, ДНК- и РНК-полимераз, алкалинфосфатаз, цистеинпротеаз, аминопептидаз, супероксиддисмутаза и т.д.);

участвует в белковом и углеводном обменах веществ, регулирует синтез нуклеиновых кислот, многих гормонов и ряда витаминов;

стимулирует работу иммунной системы (обеспечивает формирование и регенерацию эпителиальных покровов, участвует в процессе кроветворения и стимуляции иммунного ответа);

обладает высокой биологической доступностью и эффективностью в просвете тонкого отдела кишечника, так как характеризуется высокой биологической стабильностью и низкой щелочной активностью, не оказывает влияния на pH в желудке и не смещает его в щелочную сторону (уровень биологической транзитности через желудок более 80 %);

оказывает регенерирующее (пролиферативный) эффект на поврежденные участки слизистой оболочки кишечника, тем самым способствует потреблению и усвоению корма у поросят.

6. Показания к применению кормовой добавки.

Кормовую добавку «ЛАКРУА® ЦинкоСтар» применяют в стрессовых ситуациях, связанных с изменением состава корма, при переводе на другой тип кормления, а также после длительной транспортировки животных и для обогащения рациона цинком. Как следствие, применение кормовой добавки «ЛАКРУА® ЦинкоСтар» способствует восполнению дефицита цинка в организме, повышению темпов роста и развития, снижению производственных затрат на получение единицы продукции за счет оптимизации обменных процессов в организме, улучшения показателя конверсии корма, а также благоприятного влияния на общее состояние здоровья за счет отсутствия ярко выраженного негативного влияния на pH в желудке и его смещение в щелочную сторону. «ЛАКРУА® ЦинкоСтар» применяют для получения эффекта транзитности через желудок более 80 %, обеспечения адресного действия, высокой биологической доступности, эффективности в просвете тонкого отдела кишечника и как следствие повышения показателя сохранности у свиней.

7. Порядок и способ применения кормовой добавки.

Кормовую добавку «ЛАКРУА® ЦинкоСтар» вводят в состав кормов на комбикормовых заводах, а также в кормоцехах хозяйств используя существующие технологии смешивания.

Нормы ввода и схемы применения кормовой добавки:

схема применения для поросят-сосунов: 1000–1200 грамм на 1 тонну комбикорма за 3–5 дней до отъема или перехода с престартерного комбикорма на стартерный, продолжительность применения в обоих случаях не более 15 дней;

схема применения для поросят-отъемышей: 1000–1500 грамм на 1 тонну комбикорма начиная с 1-го дня после отъема от свиноматки или перехода на стартерный комбикорм, продолжительность применения в обоих случаях не более 15 дней;

схема применения для поросят на доращивании или откорме, 500–1000 грамм на 1 тонну комбикорма за 3–5 дней до предполагаемой смены комбикорма, продолжительность применения не более 15 дней.

Точное количество и продолжительность применения кормовой добавки «ЛАКРУА® ЦинкоСтар» определяется индивидуально и исходя из принятой на предприятии технологии выращивания и кормления свиней, а также целевых задач и продолжительности применения для каждой конкретной технологической группы свиней. В период применения кормовой добавки «ЛАКРУА® ЦинкоСтар» любые другие кормовые добавки с цинком необходимо исключить из рациона.

8. Возможные побочные явления и осложнения.

В рекомендованных нормах, при использовании согласно инструкции по применению и при соблюдении продолжительности сроков скармливания, кормовая добавка «ЛАКРУА® ЦинкоСтар» не вызывает побочных явлений и осложнений. Противопоказаний не установлено.

9. Совместимость с другими кормовыми добавками и ветеринарными препаратами.

Исследования по совместимости кормовой добавки «ЛАКРУА® ЦинкоСтар» с ветеринарными лекарственными препаратами и другими кормовыми добавками не производились.

10. Противопоказания для применения кормовой добавки.

Противопоказаний по применению кормовой добавки «ЛАКРУА® ЦинкоСтар» не установлено.

11. Сроки возможного использования продуктов животного происхождения после применения кормовой добавки.

Продукцию свиноводства, после применения кормовой добавки «ЛАКРУА® ЦинкоСтар» можно использовать в пищевых целях без ограничений.

12. Соблюдение предосторожности, правил личной гигиены, использование средств защиты при работе с кормовой добавкой. Оказание первой медицинской помощи пострадавшим и рекомендуемые антидоты.

Все работы с кормовой добавкой «ЛАКРУА® ЦинкоСтар» необходимо проводить с использованием спецодежды и средств индивидуальной защиты (резиновые перчатки, защитные очки, респиратор). Во время работы запрещается курить, пить и принимать еду. По окончании работы следует тщательно вымыть с мылом лицо, руки и рот прополоскать водой.

Первая медицинская помощь. Общая информация: при попадании на кожу – смыть достаточным количеством воды. При вдыхании: пострадавшего следует вывести с места воздействия на свежий воздух, обратиться за медицинской помощью (по возможности показать этикетку). При контакте с глазами: немедленно промыть глаза в течение как минимум 15 минут большим количеством проточной воды с открытыми веками, следует обратиться за медицинской помощью. При попадании вовнутрь: ротовую полость прополоскать водой и обратиться за медицинской помощью.

13. Производитель кормовой добавки.

Гуанхан Челота Минералс Нутришн Текнолоджи Ко., Лтд. (Guanghan Chelota Minerals Nutrition Technology Co., Ltd.), адрес: Групп 4, Сяонань Вилладж, Сяохань Таун, Гуанхан, Дэян, Сычуань, Китай, (Group 4, Xiaonan Village, Xiaohan Town, Guanghan, Deyang, Sichuan.P.R. China).

14. Организация уполномоченная на принятие претензий.

ООО «ЛАКРУА», адрес: 220062, Беларусь, г. Минск, пр-т Победителей, 106, офис 303. Почта: lakrua.ooo@gmail.com, тел: +375 17 303 11 81 +375 17 303 11 51

15. Порядок применения рекламаций.

Специалисты зооветеринарной службы организации-покупателя кормовой добавки ЛАКРУА® ЦинкоСтар, проводят изучение соблюдения всех правил и условий по применению кормовой добавки на производстве в соответствии с инструкцией. При подтверждении выявления отрицательного воздействия на организм животного, специалисты зооветеринарной службы организации-покупателя кормовой добавки ЛАКРУА® ЦинкоСтар в праве обратиться в ветеринарную инстанцию по месту своего территориального расположения. При участии всех заинтересованных лиц, комиссионно отбираются пробы в необходимом количестве для проведения лабораторных испытаний, оформляется акт отбора проб и направляется в государственное учреждение «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР» (г. Минск, ул. Красная, д. 19А) для подтверждения соответствия кормовой добавки нормативным документам.

Регистрационный номер: 05-2386-040626